



όσων έχουν σχέση με τη νόσο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για αυτή την «κρυφή», αλλά τόσο απειλητική για τη ζωή ασθένεια.

- Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και η διεκδίκηση από το κράτος της έμπρακτης ενεργούς συμπαράστασης προς τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους.

Επικοινωνήστε με το σύλλογό μας για κάθε ερώτησή σας σχετικά με τη νόσο, για να μας γνωστοποιήσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως ασθενείς ή ως μέλη των οικογενειών ασθενών, για να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε έμπρακτα και με ευαισθησία.

Επικοινωνία:

Περίνης Κων/νος 6934286502

Μάγγελου Δώρα 6946242800

Επισκευθείτε μας στην ιστοσελίδα μας:

www.ldlgreece.gr

e-mail: info@ldlgreece.gr

<https://www.facebook.com/oikogenis.ypercholisterolaimia>



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΗ
ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

Υπερχοληστερολαιμία είναι η αύξηση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης στο αίμα πέρα του φυσιολογικού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι πρωτογενής υπερχοληστερολαιμία.

Η πάθηση αυτή προκαλείται από την μετάλλαξη του γονιδίου του υποδοχέα της χοληστερόλης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνης (LDL).

Η νόσος εμφανίζεται είτε σε ετερόζυγη, είτε σε ομόζυγη μορφή.

Η **ετερόζυγη μορφή** (δυσμενής επίδραση μετάλλαξης κατά 50%) εμφανίζεται με συχνότητα ένα παιδί σε 200-500 γεννήσεις (στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20.000 ασθενείς). Τα επίπεδα της χοληστερόλης είναι πάνω από 290 mg/dl. Τα τριγλυκερίδια μπορεί να είναι λίγο αυξημένα ή φυσιολογικά.

Η **ομόζυγη μορφή** (δυσμενής επίδραση μετάλλαξης κατά 100%) είναι σπάνια.

Συνήθως γεννιέται ένα παιδί σε ένα εκατομμύριο γεννήσεις (στην Ελλάδα υπάρχουν 10-14 τέτοια παιδιά). Τα επίπεδα της χοληστερόλης είναι πάνω από 600 mg/dl και φθάνουν έως 1000-1500 mg/dl. Τα τριγλυκερίδια μπορεί να είναι λίγο αυξημένα ή φυσιολογικά.

ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Η αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα προκαλεί εναπόθεση λιπών στην εσωτερική επιφάνεια των αρτηριών. Οι εναποθέσεις αυτές, ονομάζονται αθηρωματικές πλάκες και προκαλούν στένωση του αυλού, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ροής του αίματος που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό θρόμβων και πλήρη διακοπή της ροής. Όταν αυτό συμβεί, ακολουθεί καρδιακό έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, τα οποία αποτελούν τις κύριες αίτιες θανάτων παγκοσμίως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος της θεραπείας είναι να ελαττωθεί η LDL (κακή χοληστερόλη) και να αυξηθεί η HDL (καλή χοληστερόλη).

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «LDL», είναι αναγνω-



ρισμένος από το Πρωτοδικείο Αθηνών δυνάμει της υπ' αριθμ. 851/2013 δικαστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ αρ. 29534 στο βιβλίο σωματείων στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

■ Η συμμετοχή και συνεργασία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ με επιστημονικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, καθώς και με άλλους συλλόγους και με κάθε συναφή φορέα, οι οποίοι ασχολούνται με κάθε τρόπο με το ζήτημα της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης με νέες βελτιωμένες μεθόδους θεραπείας, διάγνωσης και ανίχνευσης φορέων.

■ Η ενημέρωση και κάθε μορφής πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικότερα